

ข้อเสนอแนะการใช้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับโคเนื้อ

โปรแกรมวัคซีนสำหรับโคเนื้อ

วัคซีนป้องกันโรคคอบวม (เอชไอฯ) และวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (เบ็บที 1)

วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (เบ็บที 2)

อายุ 3 เดือน อายุ 4 เดือน อายุ 5 เดือน อายุ 6 เดือน

- ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรค ก่อนการการระบาดของ เช่น ช่วงต้นฤดูฝน หรือเคลื่อนย้ายสัตว์
- ฉีดวัคซีนในสัตว์อายุมากกว่า 4 เดือน รับกวนของระดับภูมิคุ้มกันที่ได้รับจา

ชนิดวัคซีนสำหรับการป้องกันโรคในโคเนื้อ

- วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) : ฉีดเข้าใต้ผิวหนังทุกๆ 6 เดือน
- วัคซีนโรคคอบวม (เอชไอฯ) : ฉีดเข้ากล้ามเนื้อลึกทุกๆ 1 ปี

โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) และโรคคอบวม (เฮโมราจิกเซพติซีเมีย) สามารถป้องกันได้โดยการใช้ “วัคซีน” อย่างสม่ำเสมอ

วัคซีน

สุขภาพสัตว์

เชื้อโรค

3 มาตรการหลัก

เพื่อทำให้การป้องกันโรคเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1. กำจัดเชื้อและป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าในฟาร์ม โดยใช้น้ำยาล้างเท้า/ล้างหน้า/ล้างตา/ล้างเชือก ที่ใช้อย่างน้อย 10 นาที และโรยปูนขาวชนิดแคลเซียมออกไซด์ (calcium oxide) หรือปูนร่อน หน้าฟาร์ม บริเวณทางเข้า-ออก อย่างสม่ำเสมอ และงดนำเข้า “สัตว์ตัวใหม่” เข้าฟาร์ม โดยไม่ทราบประวัติ และไม่มีการกักกันโรค
2. จัดการ “สุขภาพสัตว์ให้แข็งแรง” ให้อาหารหยาดอย่างเพียงพอ และสัตว์ต้องได้รับการถ่ายพยาธิภายในภายนอก เสริมวิตามิน และแร่ธาตุ เพื่อให้สามารถกระตุ้นการ “สร้างระดับภูมิคุ้มกัน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมสัตว์ “ทุกตัว” ในฟาร์ม ตามโปรแกรมและวงรอบการฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ