

## วัคซีนสำหรับสุกร ของกรมปศุสัตว์

**วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำหรับสุกร**  
(FMD vaccine for pig)  
วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ขนาดบรรจุ 7.5 ไร่ส



**วิธีการใช้ :**  
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อตัวละ 2 มล. สุกรจะมีความคุ้มโรคภายในหนึ่งสัปดาห์ วัคซีน 3-4 สัปดาห์ และอยู่ได้นาน 6 เดือน

**โปรแกรมวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำหรับสุกร**

อายุสัตว์  $\xrightarrow{2 \text{ เดือน}}$  **ฉีดที่ 1**  $\xrightarrow{3 \text{ เดือน}}$  **ฉีดที่ 2 (กระตุ้นซ้ำ)**  $\xrightarrow{6 \text{ เดือน}}$  **ฉีดซ้ำทุกๆ 6 เดือน**

**ข้อควรปฏิบัติในการทำวัคซีน**

- นำยาอะดัลทอนวัคซีนควรแช่เย็นก่อนจะฉีดยา
- วัคซีนที่จะฉีดยาแล้วต้องแช่เย็นตลอดเวลา
- ให้ผสมภายใน 2 ชั่วโมง
- ให้วัคซีนแก่สัตว์ที่มีสุขภาพดีเท่านั้น
- เก็บรักษาวัคซีนในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง
- หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด
- ทำความสะอาดบริเวณที่ฉีดด้วยสำลีแอลกอฮอล์

**วัคซีนโรคอหิวาต์สุกร (Classical swine fever vaccine)**

วัคซีนเชื้อเป็น ชนิดลดฤทธิ์ ขนาดบรรจุ 10 ไร่ส  
สูตรโมโน อะดิแวนท์



**วิธีการใช้ :**  
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเนื้อหรือใต้ผิวหนัง ตัวละ 1 มล. สุกรจะมีความคุ้มโรคภายในหนึ่งสัปดาห์ วัคซีน 5 วัน และอยู่ได้นาน 1 ปี

**โปรแกรมวัคซีนอหิวาต์สุกร**

อายุสัตว์  $\xrightarrow{6 \text{ สัปดาห์}}$  **ฉีดที่ 1**  $\xrightarrow{12 \text{ สัปดาห์}}$  **ฉีดที่ 2**  $\xrightarrow{1 \text{ ปี}}$  **ฉีดซ้ำทุกๆ 1 ปี**

ลูกสัตว์ทุกตัวที่จะทำวัคซีนต้องมีระดับภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่ไม่สูงจนเกินไป

**การจัดการเข็มและขวดวัคซีนที่ใช้แล้ว (ขยะติดเชื้อ)**

หลังจากใช้วัคซีนแล้ว ให้ทิ้งเข็มที่ใช้แล้วทิ้งเข็ม นำกระบวยฉีดยาและขวดบรรจุวัคซีนออกก่อนแล้วล้างเข็มหรือรีน้ำยาฆ่าเชื้อ และกำจัดด้วยวิธีเผาทำลายหรือจุดหลอมฝังกลบ



โปรแกรมวัคซีนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์