

วัคซีนสำหรับสุกร ของกรมปศุสัตว์

วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย
(FMD vaccine for pig)
วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
ขนาดบรรจุ 7.5 ไร่ส



วิธีการใช้ :
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อตัวละ 2 มล. สุกรจะมีความคุ้มโรคภายในหนึ่ง
สัปดาห์ และอยู่ได้นาน 6 เดือน

โปรแกรมวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับสุกร

อายุสัตว์ $\xrightarrow{2 \text{ เดือน}}$ **ฉีดที่ 1** $\xrightarrow{3 \text{ เดือน}}$ **ฉีดที่ 2 (กระตุ้นซ้ำ)** $\xrightarrow{6 \text{ เดือน}}$ **ฉีดซ้ำทุกๆ 6 เดือน**

ข้อควรปฏิบัติในการทำวัคซีน

- นำยาอะดัลยวัคซีนควรจะแช่เย็นก่อนจะฉีดยา
- วัคซีนที่จะฉีดยาแล้วต้องแช่เย็นตลอดเวลา
ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
- ไข่วัคซีนแก่สัตว์ที่มีสุขภาพดีเท่านั้น
- เก็บรักษาวัคซีนในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
ห้ามแช่แข็ง
- หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด
- ทำความสะอาดบริเวณที่ฉีดด้วยสำลีแอลกอฮอล์

วัคซีนโรคอหิวาต์สุกร
(Classical swine fever vaccine)
วัคซีนเชื้อเป็น ชนิดลดฤทธิ์
ขนาดบรรจุ 10 ไร่ส
สกรุน้ำยา ชนิดน้ำกระชาย



วิธีการใช้ :
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเนื้อหรือใต้ผิวหนัง ตัวละ 1 มล. สุกรจะมีความ
คุ้มโรคภายในหนึ่งสัปดาห์ และอยู่ได้นาน 1 ปี

โปรแกรมวัคซีนอหิวาต์สุกร

อายุสัตว์ $\xrightarrow{6 \text{ สัปดาห์}}$ **ฉีดที่ 1** $\xrightarrow{12 \text{ สัปดาห์}}$ **ฉีดที่ 2** $\xrightarrow{10 \text{ เดือน}}$ **ฉีดซ้ำทุกๆ 10**

ลูกสัตว์ทุกตัวที่จะทำวัคซีนต้องมีระดับภูมิคุ้มกัน
ที่ได้รับจากแม่ไม่สูงจนเกินไป

การจัดการเข็มและขวดวัคซีนที่ใช้แล้ว (ขยะติดเชื้อ)

หลังจากใช้วัคซีนแล้ว ให้ทิ้งเข็มที่ใช้แล้ว
ทิ้งเข็ม นำกระบะออกซิเจนและของบรรจุวัคซีน
เปิดจุกออกก่อนแล้วล้างน้ำเชื้อ
หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ และกำจัด
ด้วยวิธีเผาทำลายหรือจุดหลอม
มีลักษณะ



โปรแกรมวัคซีนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์