



**วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
(Infectious Bronchitis Vaccine)**

วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่

เป็นวัคซีนไวรัสเชื้อเป็น สเตรนที่ถูกทำให้อ่อนกำลัง ไม่เป็นอันตรายต่อไก่ที่ได้รับวัคซีนนี้ แต่สามารถให้ความคุ้มโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ได้ ผลดีจึงนำไปเป็นวัคซีนที่มีราคา

วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่

เขียนโดย คุณฐิติรัตน์

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2010 เวลา 17:00 น.

สรุพคุณ

ใช้ป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่

ส่วนประกอบ

วัคซีน 1 โดส ประกอบด้วยไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ สเตรนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 10

2.5

วิธีการใช้

ไก่กระທ ครั้งแรกเมื่ออายุ 5-7 วัน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 2-3 สัปดาห์

ไก่ไข่ ให้วัคซีนสองครั้งแรกเช่นเดียวกับในไก่กระທ ครั้งที่สาม เมื่ออายุ 6-8 สัปดาห์และซ้ำ

ทุก 3 เดือน

ขนาดที่ใช้

วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อกัน

เขียนโดย คุณฐิติรัตน์

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2010 เวลา 17:00 น.

หยอดตาหรือจุ่มกั้วละ 2 หยด

ความคุ้มครอง

ไก่จะมีความคุ้มครองภายหลังจากได้รับวัคซีน 3 สัปดาห์ และอยู่ได้นาน 3 เดือน

การเก็บรักษา

เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

ขนาดบรรจุ

ขวดละ 100 โด๊ส พร้อมน้ำยาละลาย 5 มล.

ข้อควรระวัง

ควรแช่เย็นน้ำยาละลายก่อนผสมกับวัคซีน