**การจ่ายวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (เพื่อจำหน่าย)**

**ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2566)**

| วัคซีน | ปศข.1 | ปศข.2 | ปศข.3 | ปศข.4 | ปศข.5 | ปศข.6 | ปศข.7 | ปศข.8 | ปศข.9 | สทช. | ตัวอย่าง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. อหิวาต์เป็ด-ไก่ | 113,100 | 250,000 | 45,000 | 7,000 | 11,000 | 180,000 | 314,000 | 400 | 10,000 | 18,800 | - | 949,300 |
| 2. ฝีดาษไก่ | 24,000 | 200 | 16,000 | 24,000 | 13,000 | 16,000 | 10,000 | 400 | - | 4,800 | - | 108,400 |
| 3. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซต้า+หลอดลมฯ | 38,000 | 11,000 | 48,000 | 8,000 | 33,000 | 20,000 | 21,000 | - | - | 6,200 | - | 185,200 |
| 6. หลอดลมอักเสบติดต่อไก่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. กาฬโรคเป็ด | 242,000 | 182,000 | - | - | 2,000 | 330,000 | 1,236,000 | - | - | 10,400 | - | 2,002,400 |
| 8. เฮโมรายิกเซพติซีเมีย | - | - | - | - | - | - | 930 | - | - | 3,030 | - | 3,960 |
| 9. แอนแทรกซ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. แบลคเลก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. บรูเซลโลซีส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส) | 200 | - | 20 | - | 200 | - | 5,490 | 10 | - | 4,770 | - | 10,690 |
| 14. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.ลัมปี สกิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,260 | - | 5,260 |
| 17. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ A (ลพบุรี) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (10 โด๊ส) | - | 50 | 30 | - | - | - | 490 | - | - | - | - | 570 |
| 21. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (75 โด๊ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ สุกร | 142,950 | 317,700 | 100,875 | 97,800 | 59,475 | 120,675 | 164,100 | 134,400 | 100,500 | 248,250 | - | 1,486,725 |
| 23. ปากและเท้าเปื่อยสุกร ไทป์ O(ความเข้มข้นสูง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส) | 9,800 | 13,000 | 31,100 | - | 16,000 | 37,000 | 57,600 | 96,400 | 20,000 | - | - | 280,900 |
| 25. อหิวาต์สุกร เซลล์เพาะเลี้ยง (10 โด๊ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. บรูเซลล่าเพลท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. บรูเซลล่าทิวป์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. พัลโลรุ่ม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. โรสเบงกอล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**การจ่ายวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (สคบ.)**

**ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2566)**

| วัคซีน | ปศข.1 | ปศข.2 | ปศข.3 | ปศข.4 | ปศข.5 | ปศข.6 | ปศข.7 | ปศข.8 | ปศข.9 | สถาบันฯ | เบิกฝาก | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. อหิวาต์เป็ด-ไก่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. ฝีดาษไก่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด้ส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด้ส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซต้า+หลอดลมฯ | 767,200 | 365,100 | 1,586,100 | 2,826,100 | 1,321,600 | 1,196,900 | 417,600 | 589,100 | 231,900 | 793,400 | - | 10,095,000 |
| 6. หลอดลมอักเสบติดต่อไก่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. กาฬโรคเป็ด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. เฮโมรายิกเซพติซีเมีย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. แอนแทรกซ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. แบลคเลก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. บรูเซลโลซีส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด้ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด้ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด้ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด้ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. ปากและเท้าเปื่อย 1 ไทป์ โค-กระบือ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ A (ลพบุรี) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (10 โด้ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (75 โด้ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ สุกร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. ปากและเท้าเปื่อยสุกร ไทป์ O(ความเข้มข้นสูง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. อหิวาต์สุกร (10 โด้ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. อหิวาต์สุกร เซลล์เพาะเลี้ยง (10 โด้ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. อหิวาต์สุกร (30 โด้ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. บรูเซลล่าเพลท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. บรูเซลล่าทิวป์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. พัลโลรุ่ม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. โรสเบงกอล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |