**การจ่ายวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (เพื่อจำหน่าย)**

**ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ปีงบประมาณ 2567)**

| วัคซีน | ปศข.1 | ปศข.2 | ปศข.3 | ปศข.4 | ปศข.5 | ปศข.6 | ปศข.7 | ปศข.8 | ปศข.9 | สทช. | ตัวอย่าง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. อหิวาต์เป็ด-ไก่ | 126,500 | 275,000 | 52,000 | 5,000 | 17,000 | 168,000 | 441,700 | - | - | 257,400 | - | 1,342,600 |
| 2. ฝีดาษไก่ | 2,000 | - | 6,800 | 6,000 | 21,000 | 600 | 8,000 | - | - | 4,600 | - | 49,000 |
| 3. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซต้า+หลอดลมฯ | 15,000 | 80,000 | 15,000 | 25,000 | 37,000 | 16,000 | 28,000 | - | - | 17,500 | - | 233,500 |
| 6. หลอดลมอักเสบติดต่อไก่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. กาฬโรคเป็ด | 617,400 | 164,000 | - | - | - | 438,400 | 1,532,400 | - | - | 38,600 | - | 2,790,800 |
| 8. เฮโมรายิกเซพติซีเมีย | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 360 |
| 9. แอนแทรกซ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. แบลคเลก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. บรูเซลโลซีส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส | 200 | - | - | - | - | - | 2,980 | - | - | 3,930 | - | 7,110 |
| 14. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. ปากและเท้าเปื่อย 1 ไทป์ โค-กระบือ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. ลัมปี สกิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 200 |
| 20. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (10 โด๊ส) | - | 50 | 30 | 250 | - | - | 990 | - | - | - | - | 1,320 |
| 21. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (75 โด๊ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ สุกร | 114,450 | 286,050 | 57,600 | 109,725 | 66,300 | 110,850 | 162,675 | - | - | 213,825 | - | 1,121,475 |
| 23. ปากและเท้าเปื่อยสุกร ไทป์ O(ความเข้มข้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส) | 3,700 | 7,500 | 26,500 | 34,700 | 5,000 | 20,600 | 22,200 | - | - | 4,200 | - | 124,400 |
| 25. อหิวาต์สุกร เซลล์เพาะเลี้ยง (10 โด๊ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. บรูเซลล่าเพลท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. บรูเซลล่าทิวป์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. พัลโลรุ่ม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. โรสเบงกอล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**การจ่ายวัคซีนของ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (สคบ.)**

**ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ปีงบประมาณ 2567)**

| วัคซีน | ปศข.1 | ปศข.2 | ปศข.3 | ปศข.4 | ปศข.5 | ปศข.6 | ปศข.7 | ปศข.8 | ปศข.9 | สถาบันฯ | สคบ. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. อหิวาต์เป็ด-ไก่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 2. ฝีดาษไก่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 100 โด๊ส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. นิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า เชื้อเป็น 1000 โด๊ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลลาโซต้า+หลอดลมฯ | - | - | 2,681,600 | - | - | - | - | - | - | - | 2,691,400 | 5,373,000 |
| 6. หลอดลมอักเสบติดต่อไก่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. กาฬโรคเป็ด | 617,600 | 91,600 | 125,800 | 176,800 | 44,000 | 997,400 | 347,400 | 48,600 | 50,800 | - | - | 2,500,000 |
| 8. เฮโมรายิกเซพติซีเมีย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. แอนแทรกซ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. แบลคเลก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. บรูเซลโลซีส | - | 400 | 1,000 | 4,130 | - | 1,600 | 60 | - | - | - | - | 7,190 |
| 12. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (20 โด๊ส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ โค-กระบือ (10 โด๊ส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. ปากและเท้าเปื่อย 1 ไทป์ โค-กระบือ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ O (ความเข้มข้นสูง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. ปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ไทป์ A (ลพบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (10 โด๊ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. ปากและเท้าเปื่อย 3 ไทป์ สุกร (75 โด๊ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. ปากและเท้าเปื่อย 2 ไทป์ สุกร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. ปากและเท้าเปื่อยสุกร ไทป์ O(ความเข้มข้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. อหิวาต์สุกร (10 โด๊ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. ลัมปี สกิน | 51,500 | - | 19,800 | - | - | - | 39,700 | - | - | - | - | 111,000 |
| 26. อหิวาต์สุกร (30 โด๊ส) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. บรูเซลล่าเพลท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. บรูเซลล่าทิวป์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. พัลโลรุ่ม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. โรสเบงกอล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |